

SCEHDA TECNICA TRADOTTA DALLA FARMACIA

ARTESUNATE FIALE

FORMA FARMACEUTICA E CONTENUTO

Fiale contenenti Artesunate (sterile) IP 60 mg

CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA

Artesunato è indicato per il trattamento iniziale della malaria grave.

INDICAZIONI TERAPEUTICHE

L'Organizzazione mondiale della sanità raccomanda l'artesunato come trattamento di prima linea per la malaria grave.

CONTROINDICAZIONI

Non sono state osservate reazioni avverse nell'utilizzo delle dosi raccomandate.

INTERAZIONI

L'attività dell'artemisinina in combinazione con altri farmaci antimalarici contro *P. falciparum* è stata misurata in vitro e contro *P. berghei* in vivo. Una combinazione di artemisinina con meflochina era sinergica mentre quella con pirimetamina era antagonista in vitro e in vivo. È stato anche dimostrato che una combinazione di artemisinina con altri antimalarici (sulfadiazina, sulfadossina, sulfadossina-pirimetamina, cicloguanile e dapsons) è antagonista in vivo.

DOSE, MODO E TEMPO DI SOMMINISTRAZIONE

La dose raccomandata è di 60mg giornalmente. La prima dose è doppia.

La dose raccomandata nei pazienti pediatrici è di 1.2 mg/kg.

La durata raccomandata del trattamento è di 5 giorni. La durata può essere prolungata a 7 giorni nei pazienti con patologia grave.

SOVRADOSAGGIO

I dati riguardanti le overdose di artesunato sono rari. I pazienti che manifestano un sovradosaggio possono presentare pancitopenia, melena, convulsioni, insufficienza multiorgano e morte. Trattare il sovradosaggio con misure sintomatiche e di supporto.