

TRADUZIONE DELLA FARMACIA

Nome del farmaco e principio attivo

Nome commerciale: Iniezione di **Regitin 5 mg**

Principio attivo: fenolamina mesilato

Indicazioni:

- Usato per il controllo della pressione arteriosa prima/durante gli interventi chirurgici.
- Usato nella diagnosi del melanocitoma tramite misurazione della riduzione della pressione arteriosa dopo somministrazione.

Effetti:

Agisce bloccando i recettori alfa per sopprimere l'innalzamento della pressione arteriosa indotto dalle catecolamine.

Agisce dilatando direttamente i vasi sanguigni.

Dosaggio e Modalità di Somministrazione

Forma Farmaceutica: Iniezione intravenosa o intramuscolare

Modalità di Somministrazione:

- Prima dell'intervento chirurgico: somministrare per via intravenosa o intramuscolare.
- Durante l'intervento chirurgico: somministrare per via intravenosa.
- Ripetere le dosi secondo necessità.

Conservare nella confezione originale.

Conservare in frigorifero (2° - 8°C) Non congelare.

Tenere il farmaco fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Precauzioni

- Se ha manifestato precedenti reazioni allergiche ad altri farmaci
- In gravidanza o allattamento
- Se sta assumendo altri medicinali che potrebbero interagire.

Usare con cautela nei pazienti con malattia coronarica o ipotensione.

Possibili effetti collaterali includono: vertigini, affaticamento, sincope o sonnolenza. Prestare attenzione durante la guida o l'uso di macchinari.

Reazioni Avverse

Reazioni Avverse Comuni: sintomi simili a shock causati da improvvisa caduta della pressione arteriosa, tachicardia, aritmia, ipotensione ortostatica, arrossamento della pelle, ipersensibilità, mal di testa, vertigini, sudorazione, nausea/vomito, diarrea.

Se manifesta qualsiasi evento avverso contatti subito il suo medico o farmacista.