

SCHEDA N° 28

CONTAMINAZIONE BIOLOGICA

| | |
|------|--|
| NOTA | Tutti gli spargimenti accidentali di campioni biologici devono essere riferiti al responsabile della U.O. e al Preposto/Coordinatore, che provvederanno a segnalare, sulla base della rilevanza dell'evento, della gravità e della classe dell'agente biologico, l'incidente/infortunio a Direzione Sanitaria, U.O. Servizio Prevenzione e Protezione, Medici Competenti o all'Ispettorato Aziendale al 7999 o 010-555-7999 che provvederà ad allertare Il Coordinatore dell'Emergenza |
| | CONTAMINAZIONE PERSONALE |
| | SEQUENZA AZIONI |
| 1 | In caso di sversamento accidentale di campioni biologici, avvertire immediatamente Direttore U.O./Preposto/Coordinatore |
| 2 | Se il campione biologico entra in contatto con la pelle, sciacquare subito la parte colpita abbondantemente con acqua, utilizzando le docce o i lavaocchi |
| 3 | Ricordarsi che una contaminazione accidentale può assimilarsi a un infortunio sul lavoro e quindi come tale deve essere segnalata, secondo le normali procedure aziendali |
| 4 | Recarsi alla U.O. Medicina Preventiva e/o al Pronto Soccorso, per la sorveglianza sanitaria |
| 5 | Registrare l'infortunio presso la U.O. Risorse Umane per la notifica all'INAIL |
| 6 | Recarsi presso la U.O. Servizio Prevenzione e Protezione per gli approfondimenti epidemiologici di pertinenza (Studio SIROH) |
| | CONTAMINAZIONE AMBIENTALE |
| | SEQUENZA AZIONI |
| 1 | Prima di intervenire, evacuare la stanza chiudendo le porte |
| 2 | Cambiare gli abiti |
| 3 | Lasciare depositare l'aerosol per almeno 30 minuti |
| 4 | Entrare nella stanza indossando i dispositivi di protezione individuale necessari: tuta in tyvek, semimaschera con filtri o maschera pieno facciale, guanti, occhiali o visiera (se non si è indossata la maschera pieno facciale), stivali o sovrascarpe adeguate |
| 5 | Ricoprire l'area di versamento con panno imbevuto di disinfettante (vedi Istruzione Operativa della U.O.) e lasciare agire per almeno 30 minuti |
| 6 | Informare la U.O. Igiene ed Epidemiologia per attivare l'intervento di pulizia |
| 7 | Riprendere l'attività lavorativa immediatamente dopo quest'ultimo intervento |